

MUSTANG DUO

Type d'action

HERBICIDES

Composition

Diflufenican 40 G/l
Glyphosate 250 G/l

N° A.M.M.

9600550

Formulation

(SC) SUSPENSION
CONCENTREE

Conditionnement

5L

Usages autorisés

Culture			Dose	Max. appli	DAR	ZNT
USAGES NON AGRICOLES	DÉSHERBAGE	TOUTES ADVENTICES	7 L/HA	1		5 M
USAGES NON AGRICOLES	DÉSHERB. TOTAL	TOUTES ADVENTICES	7 L/HA	1		5 M

Performances / conditions d'emploi

Performance

Mustang® Duo se révèle efficace sur un grand nombre de graminées et dicotylédones.

Pincipales espèces sensibles:

amarante réfléchie, gaillet, plantain, armoise, géranium, porcelle, atriplex, laitern, ray—grass, brunelle commune, lamsane, renouée, capselle bourse à pasteur, lotier corniculé, rumex, céraiste, luzerne, lupuline, séneçon commun, coquelicot, matricaire, séneçon, jacobée, crépis, myosotis, sabline, digitale, ortie dioïque, sagine, épilobe, panais, stellaire, érigéron, pâturin annuel, trèfle, fétuque, picris, véronique, folle avoine, pissenlit, vesce.

Dose et Conditions d'emploi

Mustang® Duo s'applique en pulvérisation, après dilution dans l'eau.

Matériel d'application :

- Usage voie ferrée: lance reliée à un pulvérisateur à dos ou train désherbeur.
- Autres usages: pulvérisateur manuel ou pulvérisateur à dos ou pulvérisateur grande

capacité type lance+tuyau+réservoir 200-400 litres. Avec ou sans cache de protection.

Volume de bouillie:

- 300 à 500 L de bouillie/ha, soit 3 à 5 litres pour 100 m².
- Pour l'usage voie ferrée avec une application via un train désherbeur : 400-500 L de



 un éclairage différent

55, rue Raspail CS80105 92594
Levallois-Perret Cedex Tél. : 01 47
59 77 00 - Fax : 01 47 37 54 52 -
www.phyteurop.com - Agrément
numéro IF017155 : distribution de
produits phytopharmaceutiques à
des utilisateurs professionnels et
non professionnels.



Attention

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. • EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

Nom commercial
MUSTANG DUO
Conseils de prudence :

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
 SP 1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. [Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.]

SPe 3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.

SPe 4 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur des surfaces imperméables telles que le bitume, le béton, les pavés et dans toute autre situation où le risque de ruissellement est important.

DRE :

6h

Détenteur homologation :

BASF AGRO

Réglementation transport ADR : Voir FDS

bouillie/ha.

Il est important de pulvériser uniformément le produit sur les surfaces à désherber.

Éviter la formation de brouillard de pulvérisation, dangereux pour les plantations et

cultures voisines, en utilisant de préférence des buses de pulvérisation spécialement

adaptées aux traitements herbicides (buses « pinceau » à fente ou buses miroir) à une

pression de 2 bars maximum.

Précautions d'emploi

Éviter tout traitement à base de glyphosate sur les fossés en eau ou à proximité.

Ne pas diriger la pulvérisation vers les parties vertes des plantes à préserver.

Traiter par temps calme, en absence de vent afin d'éviter toute dérive de bouillie sur

les cultures voisines.

Consulter le service météo de votre région et choisir une journée douce sans vent

ni pluie.

Le feuillage à atteindre doit être sec.

Application de Février à Juillet.

— Ne pas traiter à plus de 25°C.

Lors de la pulvérisation, éviter tout entraînement et toute projection directe sur les feuilles et écorces vertes des arbres et arbustes à préserver, les bordures engazonnées et les massifs de fleurs. Traiter avec un cache-herbicide à proximité de tous les végétaux à préserver (haies, massifs de fleurs, rosiers et arbustes). Éviter tout ruissellement de produit vers des cultures ou des points d'eau.

Ne pas traiter les dallages, bitumes, bordures cimentées et autres surfaces imperméables.

Recommandations

Mustang® Duo s'utilise sur des zones perméables, à l'écart de tout point d'eau ou

caniveau.

Mustang Duo peut s'appliquer tôt en saison, sur des adventices jeunes et en pleine croissance. Une application précoce permet d'obtenir un sol propre et qui le restera grâce à la persistance d'action de plusieurs mois du diflufenican ce qui limite le nombre d'interventions herbicides dans

**Attention**

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. • EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION.
 AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

l'année.

Mélanges

Les mélanges doivent être mis en oeuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels.



Attention

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. • EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. • H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRECAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**